

外科通論

佐藤進講義
門人筆記
十三

定價二十錢

佐藤進講義
門人筆記

十三編

外科通論

明治十二年二月
五日板權免許

佐藤尚中藏版

外科通論卷之十三

佐藤進講義

門人 筆記

第十五編

潰瘍論

第三十一章

○解剖的變化 ○潰瘍ノ種別
○諸般ノ局處療法 ○病因

潰瘍トハ荏苒トシテ治癒スヘキ傾向ナキ瘡面
ヲ總稱スルヲ故ニ肉牙ヲ盛ニ發生スル良性
ノ諸創ト雖用荏苒治難キモノハ亦潰瘍ニ屬
ス即チ此ノ如キ者ヲ單潰瘍ト云ス夫レ潰瘍ヲ

發生スルニハ體中局部ヲ撰ハス多クハ慢性炎
之ニ先行ス即チ一局部慢性炎ニ罹ルキハ其組
織細胞ノ為ニ浸淫セラレ遂ニ頽敗ニ陥リ易キ
モノナレハナリ然レモ只一局部ノ給養十全ナ
ラサルヨリ其組織ニ頽敗ヲ來タスモノハ之ヲ
脱疽ト名ク而シテ潰瘍ナルモノハ一局部ニ炎
症、給養不全、細胞浸淫、組織ノ變質等ノ諸症合併
シテ生スルモノトナスヘシ

慢性炎ヲ生シテコレヨリ潰瘍ヲ續發シ易キ局
部ヲ掲クルトキハ皮膚、皮下蜂窩織、腺、骨膜、骨等

トナスヘシ抑慢性炎ヨリ之ヲ續發スルヤ最初
炎部ノ中心ニ化膿或ハ乾酪變質ヲ生シ其他軟
化或ハ頽敗等諸般ノ局處作用ニ由テ漸次其機
ヲ外圍ニ及ホシ而シテ遂ニ内部ヨリ外ニ向テ
皮膚ヲ破開スルヲ常トス所謂空洞潰瘍ヲ生ス
ルナリ即チ小ナル寒性膿腫ナリ
體中ニ於テ殊ニ慢性炎ヲ多發スル所ヲ皮膚粘
膜ノ表面トナスヘシ所謂皮膚潰瘍或ハ粘膜潰
瘍ト名ク此ニ慢性炎ニ續發スル潰瘍ノ症狀及
解剖的變化ヲ詳論スヘシ先ツ假リニ下脚ノ

皮膚潰瘍ヲ一例トナサントス

患部ノ皮膚ハ血管ノ擴張ニ由テ微ニ赤色ヲ呈シ而シテ汚乙液及ヒ細胞ノ浸淫ニ由テ腫張ス之ヲ壓スレハ疼痛ヲ覺フ而シテ血管ハ漸々其數ヲ増加シ且ツ擴張ス乳嘴體ハ常ヨリ腫大シテ流動體之ヲ浸淫ス「マルピキ」層ノ細胞ハ漸次其數ヲ増加シ其上層ハ角質ニ化スルノ機十全ナラス而シテ乳嘴層ノ結組織ハ其質柔軟トナリ半ハ「ゲレ」様ニ變化ス此時ニ於テ患部ニ輕微ノ摩擦ヲ受クルトキハ菲薄ナル表皮ノ角層

容易ニ剥脱ス然ルトキハ「マルピギ」層ノ細胞層ヲ露裸セシムヘシ若シ復ヒ其面即チ細胞層ヲ刺戟スルハ其上面ニ膿ヲ産出ス此ノ膿層ハ即チ白血球ヨリ成リ而シテ其下層ハ既ニ變質シテ増大セシ乳嘴体ヨリ成ルモノナリ若シ此時期ニ於テ患部ヲ安静ニシ且ツ外来ノ刺戟ヲ防遮スルトキハ徐々ニ瘢痕ヲ造クルモノナリ若シ此ノ如ク皮膚ノ表層ニ生スル潰瘍ヲ反復シテ刺戟スルトキハ即チ炎部ノ組織化膿ニ陥リ而シテ其分子頽敗ス但シ最初ニ乳嘴体ヲ荒


第三十六圖

下脚ノ皮膚ニ生
セシ潰瘍ヲ縦斷
シテ其面ヲ顯微
鏡ニテ檢査セシモ
ノ真物ニ比スレハ
百倍ナリ

〔イ〕潰瘍面

〔ロ〕甚シク肥厚セシ表皮
即チ硬固ナル潰瘍ノ邊
縁ヲ造タル

〔ハ〕乳嚢体ノ長大及ヒ細血
管ノ增多シテ係蹄狀ヲ
成シ而シテ結組織ノ細
胞ニ由テ浸淫セラルハ
ヲ示ス



蕪シ漸々其勢

ヲ深層ニ及ホ

ストキハ即チ

十全ノ潰瘍ヲ

造クル
上圖ヲ
參見ス

シハ

粘膜ニ生スル

潰瘍モ亦其解

剖的變化ニ至

リテハ上件論

スル皮膚ノ潰瘍ト其機同一ナリトス先ツ最初
ニ粘膜ノ表面ニ漏出胞即チ白血球ヲ滲出シ然
ル後結組織中ニ洩乙性及ヒ成形的浸淫ヲ成シ
而シテ粘膜ノ血管増加シ而シテ粘膜腺ノ分泌
過多トナルモノナリ往時ハ加答兒ニ由テ生ス
ル膿球ヲシテ内皮胞ト認信セリ然レモ輒近ニ
至リテ其細胞ノ毛細管ヨリ漏出セル白血球ナ
ルコヲ確信ス若シ加答兒ニ罹ル粘膜ヲ頻リニ
刺戟スルキハ皮膚ノ潰瘍ノ條ニ論スルカ如ク
其組織軟化シ或ハ頽敗ス即チ所謂加答兒性潰

瘍ヲ生スルナリ

右ニ論スル潰瘍ノ症狀ハ慢性炎ニ續發スルモノニ屬ス之ニ反シテ潰瘍ヲ生スルニ其機ノ急速ナルモノアリ即チ其初皮膚或ハ粘膜ニ水胞ヲスルヲ發シ此胞遂ニ破開シテ膿ヲ漏出ス然ル後漸々増大シ乃チ急性炎ノ症狀ヲ呈ハスモノナリ例之軟性疳瘡ノ如シ此ノ如キ潰瘍ハ特異ノ惡液性ノ原因ナク少壯ニシテ健康ナル多血家ノ下脚ニ生スルヲ多シ此ノ潰瘍面ハ海綿狀ヲ成シ或ハ速カニ組織ノ頽敗ヲ生スルモノアリ

リ然レモ此ノ如ク潰瘍ノ急速ニ生スルハ稀ニ
レテ多クハ其生スルヤ慢性ナルモノトス
只其形狀ニ從ヒ諸般ノ局處疾患ニ潰瘍ノ名ヲ
命スルモノ多シト雖モ穩當ナラサルモノアリ
例之ハチ[↑]フス潰瘍ト稱スルカ如キ之ナリ夫レ
小腹窒扶斯ハ[↑]ペエール腺ノ蔓延性急性炎ニシ
テ炎ニ罹ル粘膜多クハ壞死ニ陥ルモノトス而
シテ壞死ニ陥ル部分ハ化シテ痂トナリ此痂遂
ニ剥脱スルモ[↑]即チ其下ニ肉芽ヲ見ルヘシ此
肉芽ハ速カニ癒痕ニ由テ治スルモノナリ此ノ

如キ肉芽面ヲシテ之ヲ潰瘍ト名クルハ其主義
ヲ失フモノナリ如何トナレハ總テ潰瘍ト名ク
ヘキモノハ肉芽面沼機ヲ失フテ荏苒沼シ難キ
ヲ總稱スレハナリ故ニ若シ¹チ²プスニ由テ腸粘
膜ニ潰瘍ヲ生シ荏苒沼シ難キハ始メテ之ヲ
真ノ潰瘍ト稱スヘキナリ

潰瘍ヲ生スルニハ反對シタル二種ノ病性作用
ヲ現ハスモノトス即チ新生ト頽敗之レナリ新
生ハ炎性產物患部ヲ浸淫スルニ由テ成リ頽敗
ハ之ニ反シテ組織ノ軟化若クハ化膿或ハ分子

ノ壊死或ハ此ノ諸機ヲ同時ニ發スルニ由テ生
スルモノナリ然レモ最初炎症性產物組織ヲ浸淫
シ然ル后類敗之ニ次クヲ常トス之ニ反シテ炎
性產物即チ細胞組織浸淫先行セシテ最初ヨ
リ組織ニ類敗ヲ来タスハ稀有ノモノトナスヘ
シ例之病院脱疽若クハ胃潰瘍ノ如キ之レナリ
潰瘍ノ性状異ナルニ從ヒ之ヲ大別シテ二種ト
ス即チ荒蕪性潰瘍及虚性潰瘍之レナリ甲者ハ
即チ新生ノ機盛ナル者ニシテ乙者ハ化膿及ヒ
類敗ノ機過多ナルモノトス其他此二種ノ潰瘍

ノ外其中間ニ位スル潰瘍種別多シト雖氏緊要
ナラサルヲ以テ贅セス

潰瘍ノ治期ニアリテハ組織ノ頽敗其表面ヨリ
歇ミ而シテ潰瘍面ハ其性質健全ノ肉芽面ニ同
シク且ツ瘢痕ヲ結フノ性狀モ亦通常ノ創面ニ
同シ虚性ノ潰瘍ニアリテハ之ニ加フルニ血管
ト細胞ノ發育盛ンニシテ化膿ノ機熄止シ結組
織ヲ發生亢進スルモノナリ荒蕪性ノ潰瘍ニア
リテハ之ニ反シテ其炎性產物漸次減却シテ平
常ニ復スルニアラサレハ治セス

潰瘍ハ其發生ニ從ヒ之ヲ二種ニ區別ス即チ特
發性及ヒ全身性潰瘍潰瘍ニ續發性潰瘍ナリ是ナリ特發性ナ
ルモノハ單純ノ局所刺戟ニ由テ發スルモノナ
リ故ニ亦之ヲ名ケテ刺戟性潰瘍トモ云全身性
潰瘍ハ全身病即チ惡液質之カ源ヲ成シ潰瘍之
ニ續發スル者ニシテ局處ノ刺戟ニ由ラサル者
ヲ云フナリ

潰瘍ヲ種別スルニハ先ツ其形狀ヲ詳カニセサ
ル可カラサルヲ以テ之ヲ左ニ論スヘシ

イ〔形狀〕正圓或ハ楕圓ナルアリ半月狀ナルアリ

不正ナルアリ輪狀ナルアリ淺キモノアリ深キモノアリ管狀即チ瘻ナリナルアリ

口底面及分泌物底面扁平ナルアリ凸ナルアリ凹ナルアリ而シテ其分泌物ハ汚穢ナルアリ臭氣ヲ帶フルモノアリ汚乙液ナルアリ腐敗液ナルアリ加之瘡面組織ノ壞死性類敗物ヲ以テ被ハル、一アリ或ハ豚脂様若シクハ粘脂様物ニテ被ハル、一アリ或ハ海綿様肉芽ヲ以テ被ハル、一アリ

ハ邊縁平坦ナルアリ隆起スルアリ或ハ其邊縁

硬クシテ胼胝狀ナルアリ或ハ尖牙狀ナルアル
等甚タ諸般ナルモノトス
ニ周圍平常ナルアリ炎ヲ生スルアリ浮腫スル
アリ硬結スルアリ變色スルモノアリ
其他遠因ニ從ツテ之ヲ稱命スルトキハ即チ腺
病性結核性梅毒性潰瘍等トナスヘシ
局處療法局處ノ刺戟ニ由テ生スル潰瘍ハ其源
因ヲ除クトキハ速カニ治スヘシ潰瘍ノ局處療
法中偉効アルモノヲ温浴トナスヘシ而シテ下
脚ニ生シテ荏苒治セサル慢性ノ潰瘍ノ如キモ

温浴ヲ施コストキハ著シク治癒ヲ促カスモノ
ナリ諸種ノ潰瘍多クハ只温浴ノミヲ以テ足レ
リトス可シ

各種ノ潰瘍ニ温浴ノ偉効アルハ吾輩日々順
天堂ニ於テ實驗スル所ナリ温浴ハ潰瘍ヲ生
スル局部ニ從ヒ手浴脚浴ヲ施ス又陰莖ニ瘡
瘡ヲ生スルカ如キ者ニハ温浴殊ニ偉効アリ
其法小壺ニ温湯ヲ盛リ之ヲ兩股間ニ置キ陰
莖ヲ湯中ニ入ル、一日ニ數回但シ一回三十
分間ヨリ一時間ニ至ルヘシ殊ニ良性ノ瘡瘡

ニアリテハ只温浴ノミヲ以テ足レリトス他
ニ冗贅ノ療法ヲ要セス加之疳瘡ノ性猖獗ニ
シテ荏苒治セサル者ニモ温浴大ニ効テリ諸
多ノ局處藥例之ハ石炭酸水皓凡水地獄石等
モ温浴ノ効ニ及ハサルヲ多シ加之右ノ局處
藥ハ患處ヲ刺戟シ治癒ヲ妨ケ却ツテ害アル
ヲアリ世醫各自ノ實驗ニ由テ其利害ヲ辨シ
得ヘキモノナレハ此ニ贅言セス
余近頃下脚ノ慢性潰瘍及ヒ諸多ノ治シ難キ
潰瘍ニ「レ」ウエルゲン氏ノ法ニ倣ヒ表皮ノ種接

法ヲ施シ始メテ其効驗ヲ見ルニ至レリ

上件論セシ各種ノ潰瘍ヲ次ニ各論シ併セテ其
各異療法ヲ論セントス

〔イ〕潰瘍ノ周圍ニ炎ヲ生スル者及過敏性潰瘍ハ
患者絶ヘス諸般ノ操作運動ヲ為スニ由テ来ル

モノトス故ニ其源ヲ除クニアリ即チ体軀ヲ安

靜ニ保ツルハ炎症及疼痛從テ減少スルモノナ

リ而シテ過敏性潰瘍ハ外来ノ刺戟ニ由テ殊ニ

疼痛劇シク且ツ出血シ易シ

〔療法〕潰瘍ノ周圍ニ炎ヲ生スル者及過敏性潰瘍

ノ療法ハ最初緩和ノ脂肪或ハ單蠟膏或ハ清涼
軟膏例之亞鉛華膏鉛膏等ヲ貼シ或ハ鉛糖水ノ
蒸漏法ヲ施スヘシ若シ此方法ニ由テ炎症減少
スト雖モ尚肉芽ノ疼痛去ラサルハ地獄石棍
ニテ瘡面ヲ劇シク腐蝕スヘシ或ハ烙鐵ヲ施メ
効アリ又絆創膏ニテ壓迫ヲ施スモ宜シ其他局
所ニ麻醉藥ヲ用ユルヲアリ例之莨菪菲沃斯亞
片等ヲ毬布ニ和シ貼ス然レモ効驗少ナシ
海綿狀潰瘍肉芽ハ即チ海綿狀ヲ成シ苗茸様ニ
皮膚ヨリ凸隆ス而シテ糊様ノ膿ヲ分泌シ且ツ

血管ニ富ムモノナリ

療法 腐蝕藥ニ由テ肉芽ヲ撲滅スルヲ最モ良ト



第三十七圖

下脚ニ生セシ海綿狀潰瘍面ニ發生セシ二箇ノ肉芽顆粒物中ニ分布スル血管ノ景狀ヲ示ス

ス即チ地獄石棍ニテ毎日之ヲ腐蝕スヘシ若シ効ナキハ腐蝕加里或ハ烙鐵ヲ貼ス可シ其他

絆創膏ニテ壓迫ヲ施コシテ卓効アリ又單易ナルハ剪刀ニテ肉芽ヲ截除スヘシ
胼胝狀潰瘍底面邊縁及其周圍ハ慢性炎ニ由テ肥厚ス加之軟骨樣ニ變スルモノナリ但シ其虛性ナルモノニアリテハ瘡面陷凹シ瘡縁ノ分界削ルカ如ク限劃セラルモノナリ
療法腱樣ニ硬固シ且ツ血管ニ乏シキ瘡縁及ヒ瘡底ノ組織ヲ軟解セシメ且ツ血管ノ發生ヲ催進セシムルニアリ乃チ溫浴琶布等効アリ其他壓迫法乃チ法ニ從テ絆創膏ヲ纏絡シ瘡縁ヲ牽

引縮小スルナリ殊ニ下脚ノ潰瘍ニ之ヲ施コシ
テ効アリ又時トシテ烙鐵ニテ瘡縁ヲ焼灼シ或
ハ芫青硬膏吐酒石軟膏ヲ貼シ化膿機ヲ催進セ
シメ治癒ヲ促カスヲアリ然レ氏諸方法多クハ
効ナキモノナリ乃チ下脚ニ生スル胼胝狀潰瘍
殊ニ脛骨ノ前面ニ生シ而シテ瘡底深クシテ骨
膜ニ達スルモノニ於テ然リトス其他下脚ヲ全
ク輪狀ニ繞絡スル胼胝狀潰瘍モ亦甚タ治シ難
キモノニ属ス若シ之ニ由テ歩行ヲ妨ケ或ハ操
作ヲ煩ハスヲアルモハ時トシテ下脚ノ切斷ヲ

要スルコト少ナカラス而シテ胼胝狀潰瘍ノ治シ
難キハ多クハ其周縁硬結スルヲ以テ通常肉芽
面ノ沼スルカ如ク瘡縁其中心ニ向テ縮小スル
ヲ能ハサルニ由ナリ如何トナレハ瘡ノ周縁ニ
存スル皮膚ハ剛固ニシテ他部ノ皮膚ニ於ルカ
如ク動移セサルカ故ナリ此ノ如ク治シ難キ潰
瘍ヲシテ其治癒ヲ催進セシムルカ為メ往時ヨ
リ諸般ノ方法ヲ試ミタリ乃チ瘡面ノ縮小ヲ促
ス為メ瘡縁ノ各所ニ深キ切入ヲナシ其切口ニ
撒糸ヲ挿入シテ之ヲ離開セシメタリ又レ空ル

ヂン氏ノ法ニ從テ表皮ノ細片ヲ瘡面ニ貼接セ
シテアリ然レモ右ノ方法著シキ奏功ヲ呈セス
余カ實驗ニ據レハ脚浴大ニ効アリ只是瘡縁ヲ
シテ柔軟ナラシムルノミナラス瘡面ニ向ツテ
瘡痕ノ發生ヲ催進
セシムルモノナリ

敗膿性潰瘍潰瘍ノ面ニ腐敗ノ機ヲ生スルバ一
ハ外来ノ刺戟或ハ局處療法宜シキヲ得サル等
ニ由リ一ハ惡液質之カ源因トナルコアリ
療法ホ口オルカルク水木醋「テレビン」油龍腦酒
石炭酸等ヲ外用スヘシ若シ腐敗ノ機日ヲ逐テ
増進スルハ即チ所謂腐蝕性潰瘍ト名クルモ

ノニテ病院脱疽ニ類似スルモノナリ此ノ如
キ症ニハ赤降汞ヲ散布シ其腐蝕ヲ制スルヲア
リ若シ効ナキハ腐蝕加里或ハ烙鐵等ヲ用ヒ
テ病勢ヲ撲滅シテ偉効アリ
竇狀及ヒ瘻狀潰瘍此ニ属スル潰瘍ハ每常空洞
狀潰瘍ヨリ續生スルモノニテ内部ヨリ漸次
外ニ向ツテ侵蝕シ遂ニ皮膚ヲ破開ス殊ニ水脈
腺ノ慢性潰爛ヨリ此症ヲ生スルヲ多シトス此
ノ如キ潰瘍ハ其上ヲ被フ所ノ皮膚變色シテ且
ツ菲薄トナレル瘡縁ノ病皮ヲ切除シテ其潰瘍

面ヲ露裸シ乾撒糸ヲ貼シ刺戟藥ヲ貼スルハ
良性ノ肉芽ヲ生シテ速カニ治スルモノナリ例
之ハ頰或ハ頸ノ皮膚ニ生スル空洞狀潰瘍或ハ
頸ノ皮下ニ生スル水脈腺ノ化膿ニ由テ皮膚菲
薄トナレル者ハ之ヲ剪除シ且ツ頰敗セシ水脈
腺ヲホルクマン氏ノ七ニテ搔削シ其上ニ乾撒
糸或ハ之レニ一半コロオル鐵液ヲ醃シテ貼ス
ルハ速カニ治癒スルモノナリ
上件論說スル潰瘍ノ病因ヲ次ニ論スヘシ總テ
慢性炎ヲ起發セシムル諸件委トク之ニ属ス之

ヲ別チテ局處源因ト全身源因ノ二種トナスヘ
局處源因局處ニ器械的或ハ舍容的ノ刺戟ヲ絶
ヘス蒙タルトキハ即チ潰瘍ヲ生ス器械的ニ屬
スルモノハ例之狹隘ノ脊ヲ穿ツモノ其壓迫ヲ
受クル足部ニ潰瘍ヲ生シ又齒牙ニ銳利ナル稜
角或ハ尖端ヲ具フルトキハ此刺戟ニ由テ口粘
膜或ハ舌縁ニ潰瘍ヲ生スルヲアルカ如シ此ノ
如キ潰瘍ハ毎ニ其邊縁ニ紅ヲ潮シ且ツ疼痛アリ
リテ刺戟性ノモノニ屬ス又舍容的ノ刺戟ニ屬

スルモノハ例之アルコルヲ多ク含メル酒類
ヲ嗜ムモノ胃ノ粘膜ヲ刺戟シテ加答兒ヲ生シ
遂ニ潰瘍ヲ生スルカ如シ即チ酒客ニ此症ヲ發
スルヲ多シ

右ニ論スル原因ノ外靜脈中ニ血液歸流ノ礙滯
ヲ生シ即チ之ニ由テ靜脈怒張シ而シテ其周圍
ノ組織ヲ壓迫シ且ツ皮膚ニ慢性癰乙液浸淫ヲ
生シ日ヲ經ルニ從テ漸次細胞ヲ集積シテ且ツ
肥厚シ遂ニ化膿及組織ノ類敗ヲ發スルトキ潰
瘍ヲ生ス此ノ如キ原因ヨリ生スル潰瘍ハ即チ

多ク下脚ニ發ス即チ下脚ノ靜脉怒張症ニ續發
スルヲ以テカラス之ヲ靜脉怒張性下脚潰瘍ト
云最初ハ簇々肉芽ヲ發生スト雖其性遲鈍ニ
シテ其周縁胼胝狀ヲ成シ癰痕ヲ結ヒ難ク經過
甚タ荏苒タルモノトス

療法ハ既ニ論スル如ク絆創膏ノ纏絡法ヲ以テ
最モ良トス其他患肢ニ高位ヲ與ヘテ安保シ靜

脉血ノ歸流ヲ助クルヲ良トス余近頃レウルヂ

表皮ノ種接法ヲ施シテ偉効アリシハ之ヲ太
田雄寧氏ノ東京醫事新誌ニ載出セリ讀者就
種接法ノ詳カナ
ルヲ知ルヘシ

右ニ論説セルモノハ潰瘍ノ局處源因ナリ次ニ
其源因ヲ全身ニ取ルモノヲ論説セントス

腺病性潰瘍此種ノ潰瘍ハ殊ニ頸部ニ多發スル
モノナリ而シテ多クハ病勢内部ヨリ外部ニ向
テ侵行ス即チ最初ハ皮膚ノ實質或ハ皮下蜂窩
織中ニ漸々膿窩ヲ造リ遂ニ内ヨリ皮膚ヲ破開
ス而シテ破口ニ迄キ皮膚ハ菲薄トナリテ其邊
縁微ニ紅ヲ潮シ而シテ皮下空洞ヨリ絶ヘス組
織ノ乾酪質ニ變セシモノ或ハ稀汁ヲ漏泄ス而
シテ其性極メテ遲鈍ナルモノトス

狼瘡性潰瘍^{ハルマス} 狼瘡ナルモノハ最初皮膚ノ上層ニ
小結節ヲ發生シ而シテ漸次其數ヲ増加シ遂ニ
潰瘍ニ變スルモノナリ抑結節ハ小ナル圓胞ノ
集積ヨリ成リ而シテ其結節中ニハ血管ノ擴張
及浸淫セラレシ組織ノ軟化ニ陷ルモノヲ發見
ス又時トシテ結節中ニ内皮胞集積シテ乳嘴狀
ヲ成シ皮中ニ深ク展入スルモノヲ見ルト以テ
カラス此ノ如キ各箇ノ結節物漸次ニ増大スル
中ハ互ニ連合混同シテ一大結節トナリ皮膚ニ
肥厚ヲ生スルヲアリ又或ハ時トシテ其表面ノ

表皮鱗屑狀ヲ成シテ剥脱スルヲアリ或ハ潰瘍
ニ陥ルヲアリ即チ所謂狼瘡性潰瘍トナルナリ
而シテ肉芽ハ海綿狀ヲ成シテ甚シク發生スル
アリ或ハ組織ヲ荒蕪スルアリ右ニ述フルカ如
ク狼瘡ノ性狀異ナルニ從ヒ之ニ各異ノ名稱ヲ
下セリ即チ肥厚性狼瘡鱗屑狀狼瘡潰爛性狼瘡
ト名クルカ如シ

狼瘡ハ多ク顔ニ生ス殊ニ鼻、頬、唇ニ生シ易シ故
ニ此病ニ由テ鼻或ハ唇等ヲ全ク缺亡シ奇怪ノ
顔貌ヲ具フルモノ世ニ少ナカラス而シテ狼瘡

性潰瘍ハ其外症ニ確タル固有症ヲ見ハサスト
雖其周圍及ヒ患部ニ見ハル、諸症ヲ參考ス
ルトキハ自ラ他症ト鑑別シ易シ但シ體中顔ヲ
除クノ外他ノ部局例之四肢或ハ咽喉眼瞼等粘
膜ニ生スルキハ鑑定大ニ難シトス如何トナレ
ハ四肢ニアリテハ「レ」プラト誤リ易ク又咽喉ニ
アリテハ媒毒ト混シ易ケレハナリ
狼瘡ハ其原ヲ全身病ニ取リ其續發症トナリテ
之ヲ皮膚ノ局部ニ現出スル者ト為サ、ルヲ得
サル如キモノ必ナカラス然レモ元來狼瘡性惡

液質ナル者アルヤ否疑團ヲ免カレス時トシテ
 腺病質ノ者ニ發スルヲアリ往時ハ之ヲ惡性ノ
 腺病ト做セリ其他狼瘡ハ梅毒或ハ腺病ニ續發
 スルヲアリ此ノ如キモノニハ之ニ命スルニ梅
 毒性狼瘡腺病性狼瘡ノ名ヲ以テス總テ狼瘡ハ
 可婚期ニ生ス男ニ比スレハ女之ニ罹リ易シ晚
 年ノ者ニハ生スルヲ稀ナリ即チ四十以上ノ年
 齒ニハ之ニ罹ルモノ甚タ少ナシトス
 療法局處療法ヲ以テ緊要トナスヘシ殊ニ狼瘡
 ノ潰瘍ニ陷リシモノニ於テ然リトス例之鼻ニ

潰瘍ヲ發シテ其部ヲ蝕食スル勢劇シキ者ニハ
局處療法即チ腐蝕藥ニ由テ其勢ヲ撲滅スルヲ
要ス如此キ症ニアリテハ固ヨリ全身療法ノ速
効ヲ奏シ得ヘキモノニアラス抑腐蝕藥ハ之ヲ
強ク瘡底及ヒ瘡縁ニ塗擦シ健組織ニ達ス可シ
殊ニ單純ノ地獄石或ハ腐蝕加里又塩酸亞鉛ヲ
腐蝕錠トシ用ユルヲ最モ良トス即チ塩酸亞鉛
ヲ穀粉ノ類ニ混和シ微量ノ水ヲ加ヘ攪和シテ
藥粥様物トナシ之ヲ潰瘍上ニ貼スルヲ良トス
總テ此ノ如キ藥品ニ由テ劇シク腐蝕セントス

ルニハ患者劇痛ニ堪サルヲ以テ豫メ「ホロオル
ホルム」ヲ吸引セシムルヲ良トス腐蝕藥中腐蝕
加里速効アリ且ツ劇痛ヲ起スモ其時間短カシ
腐蝕十全ナルキハ瘡上ニ痂ヲ結フヲ常トス而
シテ結痂剥落スルキハ即チ良性ノ肉芽ヲ見ハ
シ終ニ瘢痕ヲ結フニ至ルモノナリ此ノ如キ瘡
痕中ニ復ヒ結節ヲ生スルハ甚タ稀ナリ又患部
ノ近傍ニ新タニ結節ヲ生スルトキハ之ヲ腐蝕
スルモ害ナシ又鱗屑狀或ハ肥厚ヲナス狼瘡ニ
アリテハ局處ニ「ヨヂム」丁幾ヲ塗擦スルヲ良ト

ス或ハ狼瘡ヲ生スル皮膚ヲ截除スルモ宜シ
内服藥ニハ肝油ヲ四匙乃至五匙ヲ一日ノ量ト
シ持久シ用ヒテ効アルヲアリ又砒石劑ハ他ノ
皮膚病ニハ偉効アリト雖モ狼瘡ニハ寸効ナレ
壞血病性潰瘍此病ニ於テハ皮膚ノ各所殊ニ筋
中ニ血液溢出ヲ見ハス而シテ齒齦腫起シテ紫
色トナリ終ニ潰瘍ニ陷ルモノナリ又腸ヨリ出
血シ全身羸瘦衰弱極マリテ死ニ至ルモノアリ
如此キ劇症ハ獨乙國東海ノ濱ニ風土病トナリ
發スルヲアリ或ハ毎ニ永ク航海ニ從事スル水

夫之ニ罹ルモノナリ蓋シ塩ニ漬タル魚類ヲ永
ク食スルニ由ルナラン又陸地ニモ急性ノ壞血
病ヲ發スルヲナキニアラス即チ血斑病等之ニ
属ス其他齒齦或ハ口粘膜ニ發スル者ハ諸國ニ
於テ之ヲ見ルヘシ殊ニ小兒ニ發スルヲ多シト
ス即チ齒齦腫起シテ暗赤色トナリ微小ノ刺戟
ニ由テ出血シ易シ而シテ遂ニ潰瘍ニ陥リ黃色
ノ膿或ハ組織ノ頽敗セシモノ其創面ヲ被フ此
症ニハ病初三カラム乃至五カラムノ塩酸或ハ
硃砂ヲ凡ソ一写ノ蜂蜜ニ和シ之ヲ筆ニテ瘡面

ニ一日二回塗擦シテ効アリ内服ニハ鑛酸若クハ植酸効アリ其他總テ消化シ易キ食物ヲ與フルヲ良トス

風土病トナリテ生スル全身壞血症ハ治シ難シ時トシテ其病源タル者ヲ全ク避クルヲ能ハサルヲアリ療法ハ酸類ヲ以テ無二ノ良藥トナスヘシ

梅毒性潰瘍 梅毒性潰瘍ハ之ヲ軟性疳瘡ト硬性疳瘡ノ二種トナス可シ殊ニ軟性疳瘡潰瘍ハ著シク梅性潰瘍ノ固有症ヲ顯ハスモノナリ最初

ハ小ナル水胞疹ヲ發シ然後變シテ豌豆大ノ潰瘍トナリ其邊縁紅ヲ潮シ瘡底ハ微ニ黃色ヲ帶ヒタル豚脂様物ニテ掩ハル之ニ反シテ硬性瘡瘡ヨリ生スル潰瘍ハ其症狀自ラ異ナリ窠初龟头或ハ前皮ニ結節ヲ生シ而シテ此結節ノ表面ヨリ潰瘍ヲ生ス潰瘍ハ其性遲鈍ニシテ即チ虚性ナリ然レ氏組織ヲ荒蕪スルノ性ヲ具フルモノ少ナカラストス

廣性「コンジロマタ」ハ全身梅毒ノ輕症ナルモノニ屬ス而シテ著シク海綿様ニ發育スルノ性ヲ

具フルモノナリ殊ニ包皮肛門或ハ舌等ニ生ス
ル者ナリ是レ限局シテ皮膚層粘膜ノ表層ニ生ス
ル潰瘍ノ一種類ニ外ナラス又全身梅毒ノ末期
ニ於テ生スル皮膚層粘膜ノ潰瘍ハ其邊縁硬結シ
テ帶褐赤色ヲ呈ハシ而シテ其形輪狀ナルアリ
或ハ馬沓狀ナルアリ而シテ其性遲鈍ナルモノ
ナリ

療法 梅毒性潰瘍ノ療法ハ内治ヲ以テ主トナス
可シ即チ全身梅毒ヲ制挫スルノ方法ナリ若シ
潰瘍侵蝕性ヲ具フルキハ腐蝕藥ニテ之ヲ燒灼

ス
ル
ヲ
良
ト
ス

第十六編

慢性骨膜炎骨炎及ヒ骨疽

第三十二章

○慢性骨膜炎表面骨瘍○
症狀○贅骨^{オステオ、ピ}ノ義炎機ニ由テ

テ^新生^{スル}ハ贅骨或ハ骨腫ノ義炎機ニ由テ
ス○病^{骨瘍}因○鑑定○合理的解剖
骨膜及ヒ骨ノ慢性炎ハ之ヲ急性炎ニ比スレハ

多發スル症ナリ殊ニ慢性ノ骨膜炎ヲ居多ナリ
トス而シテ骨ノ表面ニ骨瘍ヲ合併スルハ鮮ナ
カラス抑慢性骨膜炎ハ初期ニハ分解ニ由テ治
スルモノナリト雖^氏若シ經過荏苒タルキハ漸

次化膿ニ陥リ而シテ骨ノ表面ニ潰瘍ヲ生スル
モノナリ總テ骨膜ニ慢性炎ヲ生スルトキハ骨
面ニ漸々新生ノ骨質ヲ著シク發生スルモノト
ス

骨膜ハ慢性炎ニ罹ルトキハ即チ最初周圍ノ軟
組織ニ微痛且ツ腫起ヲ發シ而シテ微ニ其作用
ヲ障碍ス殊ニ四肢ニ之ヲ發スルトキニ然リト
ス總テ局處ニ生スル疼痛ハ自然ニ起ルハ甚タ
微ナリ時トシテ全ク疼痛ヲ發セサルモノアリ
然レ氏指頭ニテ之ヲ壓迫シ或ハ他ノ物体ノ刺

戦ヲ蒙ムルハ劇痛ヲ發ス此時期ニ於テ療法
宜シキヲ得ルハ諸症漸次解散スルモノナリ
又此時期ニハ骨膜ノ外層即チ其質疎鬆ナル結
組織主トメ炎ニ罹ルモノニシテ此組織中ニハ
血管擴張シ而シテ物乙液及ヒ細胞之ヲ浸淫ス
右ニ掲クル骨膜炎ノ諸症ニ骨炎ヲ合併スルコ
アリ然ルトキハ外来ノ刺戟ナクシテ自然ニ劇
痛ヲ發スルモノナリ其楚痛殊ニ夜間ニ甚シキ
ヲ常トス若シ右ノ諸症荏苒トシテ月ヲ經ル后
解散シテ治スルコアリ然ルハ患部ノ骨質肥

厚シ而シテ其表面ニ凸隆ヲ遺スヲ常トス解剖
的ニ此部ノ變化ヲ檢スルトキハ骨膜ヲ構成ス
ル内外二層ノ膜様物ハ互ニ混同シテ既ニ區別
スヘカラサルニ至ル而シテ其外見豚脂様ヲ成
シ且ツ其質柔軟ナリ若シ顯微鏡ニ由テ之ヲ檢
スルトキハ結組織中ニ細胞浸淫シ而シテ毛細
管增多シ且ツ擴張スルヲ見ルヘシ此ノ如ク病
性的ニ肥厚セシ骨膜ハ骨面ヨリ離剥シ易シ而
シテ其下ニ露裸スル骨面ニハ小ナル突起物ヲ
現出スルモノナリ若シ此ノ如キ病骨ヲ鋸斷メ

其切面ヲ檢スルハ斯ノ骨面ニ生セル突起物
ハ新生ノ骨質ナリ其質海綿狀ニシテ骨ノ皮様
質ト連着スルヲ知ル可シ然レハ經過久シクシ
テ月ヲ累子レ病骨ニアリテハ曾テ海綿質ナル
突起物變シテ皮様質トナリ骨面ニ附着スルヲ
益々密ナリ

總テ炎ニ由テ骨面ニ隆起スル新生ノ骨質ハ何
ノ組織ヨリ生スル者ナルカヲ疑問スルトキハ
則チ此ノ新生物ヲシテ一ハ骨膜即チ其下面一ハ骨
ノ表面即チ皮様質ヨリ發生スルモノト為サハルヲ

得ス殊ニ骨膜ヨリ主トシテ産出スル者ナルヲ
信スルモノ多シ此ノ如ク骨膜炎ヨリ贅骨ヲ發
生スルモノ之ヲ成骨の骨膜炎ト云フ然レハ骨

オステオプラスチセベリオスチス

膜ニ關セスレテ只骨ノ表面ヨリ新骨ヲ發生ス
ルヲアリ此理ハ顯微鏡ノ検査ニ由テ詳カナル
可シ即チ骨面ニ口ヲ哆ラクハ「エル」管中ニハ
常ニ結組織及ヒ細血管ヲ有スルモノナリ若シ
一旦炎症ニ罹ルトキハ其發生一層増進シ「ハ
エル」管中ヨリ漸々骨ノ表面ニ現出シ而シテ粒
々タル肉芽ヲ形成シ骨膜下ニ蔓延ス然ルハ

遂ニ骨膜ノ裏面ニ連着シ日ヲ經ルニ從テ此炎症產物骨ニ化スルモノナリ此機能ニ由テ骨質ヲ新生スルノ理ヲ説明スルトキハ蓋シ人ノ曾テ信用セシ成骨の骨膜炎ハ即チ成骨の骨炎トナスヘキナリ然レモ此ノ如ク骨ノ表面ヨリ新タニ骨質ヲ發生スルニ當テ骨膜及ヒ他ノ軟組織果シテ其發生ニ微シモ預カラサルヤ否ニ至リテハ未タ確定スル能ハス是ヲ以テ之ヲ觀レハ總テ贅骨ヲ發生スル原ヲ骨膜及ヒ骨ノ兩組織トナス可シ故ニ之ヲ約言スレハ贅骨ハ骨膜

及ヒ骨表面ノ炎症刺戟ヨリ生スル產物ナリ而
シテ其之ヲ發スル機ニ至リテハ骨折後ニ生ス
ル假骨ノ發生ト同一ナルモノト知ルヘシ
化膿セスレテ贅骨ヲ造リ易キ骨膜炎ハ多クハ
全身謀毒ニ由テ來ルモノトナスヘシ又全身謀
毒ニ由テ生スル頭蓋骨或ハ脛骨ニ生スル劇痛
ハ每常成骨の骨膜炎及ヒ骨炎トナスヘシ
總テ慢性骨膜炎ハ新骨ノ發生ニ傾向アルモノ
ニシテ即チ成骨の骨膜炎ナリ之ヲ更ニ明言スレ
ハ骨膜若クハ骨表面ノ慢性炎ヨリ生スル給養

障碍ハ直チニ組織ノ荒蕪ヲ来スモノニアラス
先ヅ其初メ組織中ニ細胞滲溜ヲ成シ是ヨリ組
織ヲ成形スル性アルモノナリ

骨膜炎中右ニ掲クル成骨の骨膜炎ヲ最モ多發
スルモノトナス之ニ亞クモノヲ化膿性骨膜炎
スラチヘベリオスチス
トス左ニ欸ヲ逐テ之ヲ論セントス

化膿性骨膜炎ハ上件述フル如ク其初ノ患部ノ

皮膚水腫様ニ腫起シ且ツ壓迫或ハ運動四肢ニ
生スル

キニ由テ疼痛ヲ生ス而シテ此諸症荏苒日ヲ經

テ變スルヲナレト雖局處ノ皮膚漸次腫張ヲ増

レ而レテ之ヲ按スルキハ其腫起正シク區域ヲ
限劃セス其質柔靱ナリ日ヲ經ルニ從ツテ皮膚
紅ヲ潮シ且ツ波動アルヲ覺フヘシ此諸症凡ソ
四ヶ月乃至六ヶ月間變化スルヲナシ但シ疼痛
微ニ増加シ患部ノ作用モ亦微シク障碍ヲ増ス
ノミ若シ治術ヲ施コサスレテ病機ヲ自然ニ任
スルトキハ其腫起即チ寒膿腫破開シ綿絮ニ似タル
凝結物ヲ混スル稀膿ヲ泄スヘシ若シ破開口ヨ
リ探針ヲ送入シテ之ヲ檢スルキハ空洞ノ内面
ハ肉芽ニ由テ被ハルハヲ知ルヘシ又破開ヲ自

然ニ任セスレテ早ク皮膚ヲ切開スルトキハ時
トシテ微シモ膿汁ヲ流出スルヲナク其腫ハ粘
膠質及ヒ肉芽ニ由テ充實セラル、ヲ見ルヘシ
又時トシテ其腫ノ中心ニ微量ノ膿ヲ潯留スル
ヲアリ或ハ時トシテ全ク膿汁ノミヲ潯留スル
ヲアリ此ノ如ク諸般ノ變化ヲ呈ハスノ理ハ之
ヲ左ニ説明スヘシ最初骨膜ハ炎症產物ニ由テ
浸淫セラル而シテ日ヲ經ルニ從ヒ無數ノ血管
ヲ發生シ且ツ細胞倍集積スルトキハ結組織中
ノ胞間質ハ遂ニ化シテ粘膠質ニ變ス即チ結組

織ハ粘膠様ノ肉芽ニ變質スルモノナリ而シテ
 此變質物ハ早晚復ヒ變シテ膿汁トナリ即チ膿
 腫ニ變スルナリ若シ此ノ如キ炎症產物只骨膜
 若シクハ之ヲ包圍スル軟組織ノミヲ浸淫スル
 トキハ即チ骨ニ著シキ變化ヲ見ハサ、ルモノ
 ナリ然レ氏時トシテ骨面即チ骨膜下ニ微ニ贅
 骨ヲ生スルコトアリ又右ニ掲クル所ノ膿腫ノ膿
 汁ヲ排泄スルニ由テ漸々治シ而シテ粗舊ニ復
 スルコトナキニアラス總テ此ノ如ク骨膜炎ノ化
 膿ニ陷ルモノニアリテハ多クハ骨ニ其病的變

化ヲ及ホスモノニシテ之ヲ免カル、モノハ稀
 ナリトス故ニ骨膜炎ハ多クハ骨炎ヲ合併スル
 モノナリ殊ニ骨ノ表面ヲ侵シ慢性潰瘍性化膿
 性骨炎ヲ生ス、即チ表面骨瘍ナリ此ノ如キ骨瘍
カリエス、セルヒチ、ラリス



第三十圖

胫骨ニ生ゼル表面性骨瘍

ノ症狀ハ膿腫ノ未タ破開セサルハニ於テハ化膿性骨膜炎ノ症狀ト異ナルヲナシ故ニ之ヲ識別スルヲ頗ル難シトス若シ一旦破開シテ膿ヲ泄ストキニ於テ探針ヲ送入シ其内部ヲ檢スルトキハ即チ骨面粗糙トナリテ蠶蝕セラルカ如キヲ知覺ス可シ故ニ骨瘍ハ膿腫ノ破開ニ先タチヲ生ヤシモノナルヲ疑フ容レヌ加之病初骨膜中ニ只炎性產物浸淫スル時ニ當テ既ニ骨瘍ヲ生スルモ亦知ル可カラス故ニ骨瘍ハ必シモ化膿ヲ合併スルヲ要セサルナリ

慢性骨炎ハ其發生及ヒ經過ハ軟組織ノ慢性炎
ト一樣ナルモノトス然レモ骨ハ其質硬固ニシ
テ且ツ他物ニ由テ甚ク溶解シ難キヲ以テ其病
機ニ至リテハ微シク差異ナキヲ得サルナリ
單骨折條下ニ之ヲ詳論セシカ如ク骨ニ炎症ヲ
發スルキハ體中他ノ組織ニ於テ之ヲ見ルカ如
ク炎症產物ハ「ハ」エ「ル」管中ノ結組織ヲ浸滲ス
若シ炎症產物殊ニ細胞ヲ集積スルキハ「ハ」エ
「ル」管ノ血管壓迫セラレテ血行ヲ阻絶シ即チ給
養ヲ失フヲ以テ其局部骨疽ニ陷ナルナリ是レ

急性炎ニ發スル骨組織ノ變化ナリ然レモ慢性
炎ニアリテハ「ハ」エル「管」中ノ血管此ノ如ク速
カニ炎性產物ノ壓迫ヲ受ケテ壞死セス抑、慢性
炎ニアリテハ「ハ」エル「管」ノ結組織ニ炎性產物
ヲ漸次ニ集積スルトキハ「ハ」エル「管」之ニ抵抗
セスレテ徐々ニ廣大トナリ而シテ硬固ナル骨
ノ皮樣質ハ海綿質狀トナルモノナリ此ノ如ク
廣大トナレル「ハ」エル「管」ニハ無數ノ新細胞及
粘樣ナル胞間物質及細血管ヲ發見スヘシ即チ
骨質間ニ肉芽ノ發生ヲ見ルヘシ若シ此機増進


レテ止マサルトキハ骨質ハ漸次消耗シ炎症性産
物其地ヲ占ムルニ至ルモノナリ此ノ如キ病機
ヲ以テ考フレハ慢性骨炎即チ骨瘍ナルモノハ
元來骨中結組織ノ慢性炎ニ由テ骨質ノ溶解ヲ
生スルモノニ外ナラサルナリ即チ骨中此ノ如
ク炎ニ由テ給養ヲ障碍セラル、トキハ骨中漸
々「カルク」質ヲ失ナヒ而シテ有機物ハ炎ニ由テ
新タニ產生セラレシ血管ニ由テ吸收セラル、
ニ由ルナリ

骨瘍ノ稱名ハ往時ハ骨ノ化膿ニ潰爛ヲ併發ス

カリニス

第三十九圖

骨瘍ニ罹ル骨ヲ切
割ノ其面ヲ顯微鏡ニ
テ検査セシモノ即チ
骨瘍部ニ肉芽ヲ發
生シ之ニ由テ「カルク
質溶解セラレ且ツ
骨組織ノ有機物吸
收セラル、ヲ示ス真
物ニ比スレハ凡ソ三百
五十倍



ルモノニ用キレナリ然レモ輓近醫學ノ進歩高
尚ナルニ由テ之ヲ考フレハ骨瘍ハ必シモ化膿
ヲ要スルモノニアラス故ニ骨瘍ノ稱名ハ漸次
之ヲ廢棄シ骨瘍ノ性狀異ナルニ從ヒ之ヲ成骨
的^{スチセ}骨炎、潰瘍性骨炎、肉芽性骨炎、^{「ホルクマン」氏}等
ト稱スルカ如ク骨炎ニ他ノ語ヲ形容シ用ユル
ヲ適中ナリトス又骨瘍ノ稱名ハ只骨ニ蟲ノ蠶
蝕セシカ如キ粗糲面ヲ見ハス骨質ノ消亡ノミ
ニ用ユルモ宜シ故ニ「ホルクマン」氏ハ骨瘍性骨
質ノ變化ヲ別名シテ^{「クマシ」}凹窩狀侵蝕ト云フ

骨膜及ヒ骨ノ慢性炎ハ其原因ヲ全身ノ疾患ニ
取ルヲ多シトス而シテ衝突打撲等ノ外傷之カ
誘因ヲ為スモノナリ故ニ其原因ハ外傷ニアラ
ス既ニ全身ニ存スル者トナス可シ若シ此原因
ヲ既往ニ存スルヲナクンハ外傷部ハ即チ尋常
ノ經過ト轉期ヲ為メ治ス可シ抑慢性炎ノ源ト
ナル全身病多シト雖凡殊ニ腺病及ヒ梅毒之カ
原因トナルヲ多シ殊ニ骨膜及ヒ骨ニ炎症ヲ生
シ易シトス但シ小兒ニアリテハ肉芽性骨瘍大
人ニアリテハ遲鈍性骨瘍ヲ生シ易キヲ常トス

其他骨中ニ結核ヲ發スルヲアリ然レモ骨膜若クハ皮様質ニ之ヲ發見スルハ稀ナリ多クハ海綿質ニ之ヲ發生シ易シ又上件述フル所ノ惡液質ノ徵ヲ見サル者慢性骨膜炎ニ罹ルヲアリ如此キ者ニアリテハ之カ原因トナルヘキ者ヲ發見スルヲ難シ又老年ノモノニアリテ輕些ノ外傷ヨリ骨膜炎ニ骨瘍ヲ合併スルヲアリ然ルモハ其病性多クハ遲鈍ナリトス慢性炎ニ由テ生スル骨中ノ炎性產物ハ全身疾患増進シ體力衰フルニ從テ共ニ其病勢ヲ減衰

セシムルモノナリ故ニ骨瘍ニ由テ死ニ至ラン
トスル小兒ニ於テハ骨瘍ハ常ニ遲鈍性ナリ是
レ即チ死ニ瀕メ全身ノ給養十全ナラサルニ由
ルナリ病理解剖學者ハ常ニ骨瘍ヲ屍ニ就テノ
ミ剖視スルカ故ニ其真性ヲ詳知スルコト少ナシ
殊ニ肉芽性骨瘍ノ如キハ之ヲ稀有ノ疾患トナ
スト雖モ然ラス生活體殊ニ手術ニ由テ截除セ
シ小兒ノ關節頭ニハ肉芽性骨瘍ヲ發見スルコ
ト少ナカラス
上件論スル所ノ骨瘍ノ鑑識ハ只探針ノ用法ノ

ミヲ論セリ次ニ骨瘍ノ肉芽性ナルカ將タ遲鈍
性ナルカヲ鑑定スルハ如何ノ方法ニ由ル可キ
カヲ論ヤントス夫レ骨瘍ノ何性タルヲ識別ス
ルハ只治術ノミニ緊要ナルニアラス其豫后ヲ
定ムルニ亦タ必要ナルモノトス如何トナレハ
遲鈍性骨瘍ハ肉芽性骨瘍ニ比スレハ豫后不良
ナリ是レ他ナシ遲鈍性骨瘍ハ常ニ給養十全ナ
ラサル者若ハ老人ニ發スル者ナレハナリ抑、肉
芽性骨瘍ト遲鈍性骨瘍ヲ鑑別スルハ困難ナル
術ニアラス肉芽性骨瘍ニアリテハ骨瘍關節頭

ニアルトキハ骨膜皮膚殊ニ關節囊靱帶著シク
腫張ス而シテ此部ヲ按摩スルキハ柔軟ニシテ
海綿様ナリ若シ皮膚破開スルキハ肉芽其瘡口
ヨリ突出シ而シテ粘膠ニシテ且ツ關節液ニ似
タル粘様ノ膿ヲ流出ス若シ探針ヲ瘡口ヨリ送
入シテ之ヲ探檢スルキハ探針ノ末端直チニ裸
露セル骨面ニ抵觸セス先ツ肉芽ヲ竄透シ然ル
後粗ナル骨面ニ達ス可シ之ニ反シテ遲鈍性骨
瘍ニアリテハ患部ノ皮膚菲薄ニシテ紅ヲ潮シ
時トシテ變質スルコトアリ而シテ破開セシ瘡縁

ハ銳正ニシテ斫ルカ如ク而シテ沕乙性ノ稀膿
ヲ流出ス時トシテ惡臭ヲ帶ヒ且ツ腐敗セシ膿
汁ヲ泄スコアリ又時トシテ皮膚層及ヒ皮下蜂窩
織ハ著シク浮腫スルコアリ若シ探針ヲ瘡口ヨ
リ送入スルトキハ直チニ軟組織ヲ消亡セシ粗
ナル骨面ヲ探知ス可シ是レ肉芽性骨瘍ト遲鈍
性骨瘍ヲ鑑別スルニ緊要ナルモノトナスヘシ

V.13
#1305202299

外科通論卷之十三終

東京第四大區四小區
湯島五丁目十三番地

出版人

佐藤尚中

右同所

述人

佐藤進

發兌書林

馬喰町二丁目五番地

島村利助

